

IDENTIFICATION DU PATIENT

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

IDENTIFIER LES INDICATIONS DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE

 Personne qui se présente avec un traitement prescrit de Ceftriaxone en injection intramusculaire

ÉLIMINER LES CONTRE-INDICATIONS ET LES SIGNAUX D'ALARME

 Hypersensibilité de type anaphylactique connue à la lidocaïne ou à d'autres anesthésiques de type « caïne » Contre-indication reliée à l'injection de la Ceftriaxone IM

Présence d'une ou plusieurs contre-indications ?

 OUI > Référer NON > Continuer

AUTRES OBSERVATIONS (ÉTAT GÉNÉRAL ET PRISE DES SIGNES VITAUX, LE CAS ÉCHÉANT)

Prescription faite dans le contexte de l'OC PC-51 Lidocaïne - diluant pour Ceftriaxone IM (Pratiques Collaboratives)

Individualisée(s) au nom du Dr _____ No permis _____

RATIONNELLE DU TRAITEMENT

 Réduire la douleur reliée à l'injection et augmenter la tolérance au traitement Reconstitution du médicament selon les directives spécifiques du fabricant

RECONSTITUANT

 Solution de lidocaïne à 1 % sans épinéphrine Reconstitution - volume normal Reconstitution - volume réduit

AUTRES NOTES / JUSTIFICATIONS CLINIQUES

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL

 Pharmacien(ne) Infirmier(e)